

Aciclovir Sandoz

200 mg, 400 mg, 800 mg Tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några **biverkningar** blir värre eller om du märker **någrabiverkningar** som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Aciclovir Sandoz och vad används det för?
2. Innan du använder Aciclovir Sandoz
3. Hur du använder Aciclovir Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Aciclovir Sandoz

Vad innehåller Aciclovir Sandoz ?

- Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg respektive 800 mg
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (35 mg, 70 mg resp.140 mg), mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, kopovidon och magnesiumstearat.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

Tillverkare

Salutas GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-391 79 Barleben

och

Hexal A/S, Kanalholmen 8-18, DK-2650 Hvidovre

1. VAD ÄR ACICLOVIR SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

200 mg tablett: Vit, rund tablett med brytskåra på den ena sidan.

400 mg tablett: Vit, bikonvex, avlång tablett med brytskåra på båda sidorna.

800 mg tablett: Vit, bikonvex, avlång tablett med brytskåra på båda sidorna

Läkemedelsgrupp

Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus.

Vad används Aciclovir Sandoz för?

Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus.

Aciclovir Sandoz används mot svåra **infektioner** i hud och slemhinnor orsakade av **herpes-simplexvirus** eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande **herpes-simplexinfektioner** i könsorganens hud och slemhinnor. Aciclovir Sandoz används också för behandling av vattkoppor och för behandling av **bältros (herpes zoster)**.

Aciclovir Sandoz används för att förebygga **infektioner** orsakade av **cytomegalovirus (CMV)** efter benmärgstransplantation.

2. INNAN DU ANVÄNDER ACICLOVIR SANDOZ

Använd inte Aciclovir Sandoz :

- om du är allergisk (överkänslig) mot aciklovir, valaciklovir eller något av övriga innehållsämnen i Aciclovir Sandoz.

Var särskilt försiktig med Aciclovir Sandoz :

Du bör tala om för din läkare om du har nedsatt njurfunktion.

För äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

Intag av Aciclovir Sandoz med mat och dryck:

Aciclovir Sandoz kan intas med mat och dryck.

Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aciclovir Sandoz under graviditet.

Amning

Aciclovir Sandoz går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aciclovir Sandoz under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Ingen känd påverkan.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Aciclovir Sandoz

:

Aciclovir Sandoz innehåller **laktos**.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Det är speciellt viktigt att din läkare känner till om du samtidigt behandlas med litium (mot depression) och teofyllin (mot [astma](#)).

3. HUR DU ANVÄNDER ACICLOVIR SANDOZ

Doseringsanvisning

Ta alltid Aciclovir Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

[Dosen](#) bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig beroende på din sjukdom.

Om du använder mera Aciclovir Sandoz än du borde:

Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Aciclovir Sandoz :

Ta inte dubbel [dos](#) för att kompensera för glömd [dos](#). Om du glömt att ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift.

Effekter som kan uppträda när behandling med Aciclovir Sandoz avslutas:

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Aciclovir Sandoz orsaka [biverkningar](#) men alla användare behöver inte få dem.

[Biverkningar](#) indelas i vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter), mindre vanliga (färre än 1 av 100 patienter) och sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter).

Vanliga: Hudutslag.

Mindre vanliga: Lätt påverkan på bildningen av [blodkropparnässelutslag](#), [klåda](#).

Sällsynta: Yrsel, allergisk överkänslighet, vätskeansamling, känslighet för solbestrålning, andnöd, [inflammation](#) i levern, gulsot. Dåsighet, förvirring, hallucinationer och kramper, framför allt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Övriga [biverkningar](#) som rapporterats är illamående, kräkning, diarré, buksmärtor och lätt njurpåverkan samt huvudvärk, trötthet och håravfall, dock utan att något samband med behandlingen har kunnat fastställas.

Om några [biverkningar](#) blir värre eller om du märker några [biverkningar](#) som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV ACICLOVIR SANDOZ

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Denna bipacksedel godkändes senast den 2010-12-09