

**Diproderm 0,05 % kräm**  
betametasondipropionat

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

**I denna bipacksedel finner du information om:**

1. Vad Diproderm är och vad det används för
2. Att tänka på innan du använder Diproderm
3. Hur du använder Diproderm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diproderm ska förvaras
6. Övriga upplysningar

**1. VAD DIPRODERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR**

Preparatet som innehåller kortikosteroider, som används utvärtes, klassificeras enligt fyra styrkor: I Milda, II Medelstarka, III Starka och IV Extra starka. Diproderm är ett starkt verkande kortikosteroidpreparat (grupp III) som lindrar inflammation och kliande.

Diproderm används för lokal behandling av inflammatoriska och allergiska hudsjukdomar. Diproderm lindrar svullnad, rodnad och kliande.

Kräm är avsedd för akuta och vätskande hudutslag.

**2. INNAN DU ANVÄNDER DIPRODERM**

**Använd inte Diproderm**

- om du är allergisk (överkänslig) mot betametasondipropionat eller mot något av övriga innehållsämnen i Diproderm.
- om du har tidigare fått allergiska symptom vid användning av denna eller något annat kortikosteroidpreparat.
- om du har någon bakterie-, virus- eller svampinfektion på huden.

**Graviditet och amning**

Rådgör alltid med läkare före användning under graviditet och amning. Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

**Viktig information om något innehållsämne i Diproderm**

Diproderm kräm innehåller klorkresol och cetostearylalkohol. Klorkresol kan ge allergiska reaktioner. Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

### **3. HUR DU ANVÄNDER DIPRODERM**

Använd alltid Diproderm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Diproderm kräm påstryks tunt på eksemområdet en eller två gånger dagligen (på morgonen och på kvällen). Om läkaren inte ordinerat annat, bör Diproderm inte användas med ocklusion. Vid behandling av huden i ansiktet, halsen, genitalier eller i hudveck t. ex. armhålorna och ljumskar måste man vara speciellt försiktig.

Läkemedlet bör användas endast på huden. Undvik att få Diproderm i ögonen.

Diproderm bör inte användas på stora kroppsytor.

Berätta för läkare om du samtidigt använder något annat läkemedel.

Om besvären försämras eller ser infekterade ut, bör läkaren kontaktas.

#### **Om du använt för stor mängd av Diproderm**

Om för stor dos har använts, för långvarigt eller läkemedlet har hamnat i munnen eller svalts, kontakta läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

### **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Diproderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har ibland förekommit vid användning av Diproderm: sveda och klåda i huden, hudirritation och hudförtunning.

Om Diproderm används på barn måste tillståndet följas noggrant emedan läkemedlet absorberas via huden och kan ha verkan på barnets växt eller orsaka andra biverkningar.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonalen.

### **5. HUR DIPRODERM SKA FÖRVARAS**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

### **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

**Innehållsdeklaration**

Den aktiva substansen är betametasondipropionat. En gram Diproderm kräm innehåller 0,64 mg betametasondipropionat motsvarande 0,5 mg betametason.

Övriga innehållsämnen är: Klorkresol, cetomakrogol 1000, cetostearylalkohol, flytande paraffin, vit vaselin, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra, renat vatten

**Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vit och mjuk, olja-vatten emulsion,  
100g aluminiumtub

**Innehavare av godkännande för försäljning**

Merck Sharp & Dohme B.V.  
Box 581  
2003 PC Haarlem  
Nederländerna

**Tillverkare**

Schering-Plough Labo n.v.  
Heist-op-den-Berg,  
Belgien

**Information lämnas av**

MSD Finland Oy  
PB 46  
02151 Esbo

**Denna bipacksedel godkändes senast den 24.10.2012**