

# Flukloxacillin

500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter  
flukloxacillin

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Flukloxacillin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Flukloxacillin
3. Hur du tar Flukloxacillin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Flukloxacillin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

## 1. Vad Flukloxacillin är och vad det används för

Den aktiva substansen i Flukloxacillin, flukloxacillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Flukloxacillin skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.

Flukloxacillin används för infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.

## 2. Vad du behöver veta innan du använder Flukloxacillin

## **Använd inte Flukloxacillin**

Om du är allergisk mot penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.1) ska Flukloxacillin inte användas.

## **Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Flukloxacillin.

Om du är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådöra med din läkare innan Flukloxacillin används.

## **Andra läkemedel och Flukloxacillin**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Flukloxacillin, till exempel vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat), mot gikt (probenecid) och vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin).

Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas.

## **Flukloxacillin med mat och dryck**

Flukloxacillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna.

## **Graviditet och amning**

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Flukloxacillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Flukloxacillin under amning.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

### 3. Hur du tar Flukloxacillin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Läkaren bestämmer dosen så att den passar för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

*Även om du känner dig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Flukloxacillin kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.*

### Om du har tagit för stor mängd Flukloxacillin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

### 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Flukloxacillin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Flukloxacillin kan i sällsynta fall ge upphov till en kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Om ett eller flera av följande symtom uppkommer bör sjukvården omedelbart kontaktas. Symtomen vid en sådan reaktion kan vara hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel.

*Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas):* Magbesvär, främst illamående, eller diarré, samt hudutslag.

*Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas):* Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).

*Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas):* Tjocktarmsinflammation, leverpåverkan.

*Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000 drabbas):* Klåda.

*Har rapporterats (förekommer hos okänt antal personer):*

Yrsel, buksmärtor, kräkningar.

Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.

Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.

#### *Rapportering av biverkningar*

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. [Postadress](#)

## **5. Hur Flukloxacillin ska förvaras**

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som står på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

1 tablett innehåller:

*Den aktiva substansen är:* flukloxacillinnatriummonohydrat motsvarande flukloxacillin 500 mg och 750 mg.

*Övriga innehållsämnen är:* magnesiumstearat, povidon, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa. Filmdragering: färgämne (titandioxid E171), makrogol, paraffin, hypromellos.

## **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

*Tablett 500 mg:* Plastburk 30 st, 50 st, 100 st. Tryckförpackning 98 x 1 (endos).

*Tablett 750 mg:* Plastburk 20 st, 30 st, 50 st, 100 st. Tryckförpackning 98 x 1 (endos).

## **Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Denna bipacksedel ändrades senast 2014-05-07