

# Furosemid

40 mg tablett

## Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. VAD FUROSEMID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER FUROSEMID
3. HUR DU ANVÄNDER FUROSEMID
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR FUROSEMID SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

## 1. VAD FUROSEMID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Furosemid är ett urindrivande medel (diuretikum) som är snabbverkande och som kraftigt ökar urinutsöndringen. Detta ger även blodtryckssänkning. Den urindrivande effekten märks efter ½-1 timme, når sitt maximum efter 1-2 timmar och försvinner efter 4-6 timmar. Effekten på blodtrycket varar något längre.

Furosemid används vid olika typer av sjukdomstillstånd som orsakar vätskeansamling och svullnad i vävnaden (ödem) samt vid högt blodtryck.

## 2. INNAN DU ANVÄNDER FUROSEMID

### Använd inte Furosemid

- om du är allergisk (överkänslig) mot furosemid eller liknande ämnen (sk sulfonamider) eller något av övriga innehållsämnen i Furosemid.

- om du har svår lever- eller njurskada.

## **Var särskilt försiktig med Furosemid:**

I början av behandlingen, vid höga doser och/eller vid samtidig användning av digitalis är risken för kaliumbrist särskilt stor. Saltfattig kost måste undvikas och kaliumbrist bör förebyggas. Rådgör med läkaren innan behandling med Furosemid påbörjas.

Furosemid kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

## **Intag av andra läkemedel**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Vissa medel vid bakterie- och virusinfektioner (gentamicin), vissa medel vid hjärtsjukdomar (ACE-hämmare, digitalisglykosider, sotalol), vissa medel mot inflammationer och reumatism (NSAID) och vissa lugnande medel (litium) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Furosemid. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

## **Graviditet och amning**

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare *före* användning av Furosemid under graviditet.

Risk finns att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför *inte* Furosemid under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölmängden kan minska.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

Furosemid påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

## **Viktig information om något innehållsämne i Furosemid**

Furosemid innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

## **3. HUR DU ANVÄNDER FUROSEMID**

Använd alltid Furosemid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

*Vanlig dos för vuxna: Ödem:* ½ - 1 tablett på morgonen. Ibland kan högre dygnsdos behövas och i så fall delar man upp denna på 2-3 doser dagligen.

*Högt blodtryck:* ½ - 2 tabletter dagligen.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

## **Om du har tagit för stor mängd av Furosemid**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

## **Om du har glömt att ta Furosemid**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Furosemid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

*Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):* Minskad blodvolym. Kaliumbrist, vilket kan behöva behandlas med kaliumtabletter. För låg halt av klor, natrium, magnesium och kalcium. Överskott av urinsyra i blodet.

*Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):* Illamående, kräkningar och diarré.

*Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):* Njurinflammation. Förändringar i blodbilden, som t ex agranulocytos. Hudreaktioner såsom klåda, nässelutslag, fjällning, rodnad och inflammation i huden, små blödningar i hud och slemhinnor. Kärilväggsinflammation, förhöjd blodsockerhalt. Ringning i öronen med yrsel. Nedsättning av hörseln, vilket försvinner då medicineringen upphör. Överkänslighet mot solljus. I enstaka fall har gallstopp (kolestas), förändringar i lever och inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) inträffat.

Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du får:

- en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom t ex ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, så att man via blodprov kan utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos) se ”Var särskilt försiktig med Furosemid”.

- hudutslag.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **5. HUR FUROSEMID SKA FÖRVARAS**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

### **Innehållsdeklaration**

- Den aktiva substansen är furosemid. En tablett innehåller 40 mg furosemid.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 59,93 mg, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vit, rund, kupad tablett med delskåra. Diameter 7 mm.

Tryckförpackning (PVC/aluminium) 100 och 100 x 1 tabletter (endos).  
Plastburk (HDPE) 500 tabletter (endast för dosdispensering och sjukhusbruk).

Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-05-02