

Bipacksedel: Information till användaren

Gyno-Daktarin 2 % vaginalkräm mikonazolnitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller du mår sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Gyno-Daktarin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Gyno-Daktarin
3. Hur du använder Gyno-Daktarin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gyno-Daktarin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gyno-Daktarin är och vad det används för

Mikonazol i Gyno-Daktarin -vaginalkrämen är effektivt mot infektioner orsakade av jästsvampar och andra svamporganismer. Därtill verkar det mot infektioner orsakade av vissa grampositiva bakterier.

Gyno-Daktarin -vaginalkräm används för lokal behandling av jästsvamp- och andra svampinfektioner i slidan och de yttre könsorganen. Symtom på svampinfektion är bl.a. klåda, rodnad eller vitflytning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Gyno-Daktarin

Använd inte Gyno-Daktarin

- om du är allergisk mot mikonazol/mikonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot några andra imidazolderivat. Om klådan eller rodnaden blir värre efter det behandlingen påbörjats, kan det vara ett tecken på att patienten är överkänslig mot preparatet. I detta fall skall behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gyno-Daktarin.

Det är skäl att konsultera läkare före användningen av Gyno-Daktarin om det är första gången man har klåda eller andra besvär i slidan, om man har en slidinflammation för tredje gången under det gångna halvåret eller om man är under 16 år.

Sköt den personliga hygien väl, för att inte smitta andra. Låt ingen annan använda dina tvätttillbehör eller din handduk.

Även din sexualpartners eventuella inflammation måste behandlas samtidigt, för att du inte skall bli besmittad på nytt. Konsultera läkaren för närmare anvisningar.

Bensoesyra är lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Graviditet och amning

Försiktighet bör alltid iakttagas vid användning av mediciner under graviditetens tre första månader och under amning. Konsultera läkaren om användningen av Gyno-Daktarin -vaginalkräm under graviditet och amning.

Användning av preventivmedel av latexgummi

Vid behandling med Gyno-Daktarin skall man inte använda preventivmedel tillverkade av latexgummi såsom pessar (preventivmedel av latexgummi som förs in i slidan) eller kondom, då Gyno-Daktarin kan skada latexgummit och försämra dessa medels preventiveffekt eller skyddseffekt mot sjukdomar. Under behandlingen skall man använda annan typ av preventivmedel.

Andra läkemedel och Gyno-Daktarin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Läkemedel som påverkar blodets koagulering: Diskutera med läkare eller apotekspersonal före användning av Gyno-Daktarin om du behandlas med läkemedel som påverkar blodets koagulering, t.ex. warfarin.

Andra läkemedel: Effekten av vissa andra läkemedel och biverkningarna av dessa kan öka om de används samtidigt med mikonazol. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

3. Hur du använder Gyno-Daktarin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningar i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Slidinfektioner: 1 applikator kräm in i slidan varje kväll i en vecka.

Läkemedlet bör appliceras strax före läggdags, för krämen hålls bättre i slidan i liggande ställning. Man bör fortsätta behandlingen en hel vecka, fastän klådan, rodnaden eller vitflytningen skulle sluta redan tidigare. Man bör fortsätta med behandlingen också under menstruationen.


Infektioner i de yttre könsorganen: stryk ut Gyno-Daktarin -vaginalkräm tunt på det inflammerade hudområdet 1–2 gånger dagligen (hos kvinnor på de yttre könsorganen och ändtarmsöppningen, hos män på ollonet och förhuden). Behandlingstiden varar i allmänhet minst 1–2 veckor.

Läkaren kan ha ordinerat en dosering av läkemedlet som avviker från den ovannämnda. Följ alltid läkarens ordination.

Kontakta läkare om en klar förbättring inte sker inom några dagar.

Bruksanvisningar

1. Öppna tubens skruvkork och tryck håll på sigillet med korkens spets.
2. Ta en doseringsspruta för engångsbruk ur sprutförpackningen och skruva fast den på tuben, så att den grönmärkta änden av sprutan sitter stadigt fast runt gängorna på tubens hals.



3. Tryck försiktigt kräm ur tuben in i sprutan tills kolven stigit till märket ("STOP"). Lösgör doseringssprutan från tuben och stäng tuben med skruvkorken.



4. Det är lättast att föra in doseringssprutan i slidan då man ligger på rygg med knäna böjda och benen lätt särade. För in doseringssprutan i slidan så långt den går och tryck in kolven i sprutan så att krämen hamnar i slidan. Drag därefter ut sprutan med kolven intryckt och släng den använda sprutan (dock inte i WC-stolen).



Om du har använt för stor mängd av Gyno-Daktarin

Lokal överdosering av Gyno-Daktarin -vaginalkräm är i allmänhet inte farligt. För säkerhets skull bör man dock kontakta läkare om man av misstag tagit Gyno-Daktarin via munnen.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt rådgivning.

Anvisningar till läkaren: Om patienten har svält stora mängder Gyno-Daktarin, används lämplig stödjande behandling. Om patienten samtidigt använder vissa andra mediciner (t.ex. diabetesmedicin som tas via munnen eller fenytoin) kan effekten av dessa preparat förstärkas och antalet biverkningar öka.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Gyno-Daktarin tolereras vanligen väl. Speciellt i början av behandlingen kan rodnad, klåda, hettande känsla eller lokal irritation i slidan förekomma. I allmänhet försvinner symtomen av sig självt. Om symtomen är mycket besvärande eller om det också förekommer nässelfeber eller hudutslag, skall man avbryta behandlingen och uppsöka en läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
FI-00034 Fimea

5. Hur Gyno-Daktarin ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är mikonazolnitrat. Gyno-Daktarin 2 % vaginalkräm innehåller mikonazolnitrat 20 mg/g.
- Övriga innehållsämnen är polyetylenglykolstearat och glykolstearat, oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, bensoesyra, butylhydroxianisol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Vaginalkrämen är vit och homogen kräm.

Gyno-Daktarin vaginalkrämen tillhandahålls i förpackning om 40 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalavägen 2
02130 Esbo

Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast

16.6.2014