

## **BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN**

Xylocain 10 mg/dos kutan spray, lösning  
lidokain

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

**I denna bipacksedel finner du information om:**

1. Vad Xylocain är och vad det används för
2. Innan du använder Xylocain
3. Hur du använder Xylocain
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xylocain ska förvaras
6. Övriga upplysningar

### **1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR**

Xylocain kutan spray innehåller ett lokalbedövningsmedel och har smärtstillande effekt.

Xylocain kutan spray används för att ge tillfällig bedövning eller smärtlindring inför undersökning/ingrepp utförda av läkare eller tandläkare, t ex:

- undersökning av andningsvägarna
- i samband med mindre kirurgiska ingrepp i hals, mun och näshåla
- i samband med käkhålepunktion
- i slutskedet av förlossning och vid ihopsyning av förlossningsskador
- inom tandvård, t ex inför injektion

Xylocain kutan spray är avsett för vuxna och barn från 3 års ålder.

Lidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

### **2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOCAIN**

**Använd inte Xylocain**

- om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller något annat lokalbedövningsmedel eller mot något av övriga innehållsämnen i Xylocain.

### **Var särskilt försiktig med Xylocain**

- Användning av Xylocain kutan spray i mun och andningsvägar kan påverka sväljförmågan och därmed öka risken för att man ofrivilligt får Xylocain spray i luftstrupen. Bedövningen kan också öka risken för bitskador. Före intag av mat och dryck bör därför bedövningen ha släppt helt.
- Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain kutan spray om du lider av hjärt-kärlsjukdom, störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), porfyri (ärfvlig rubbning i ämnesomsättningen), har allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

### **Användning av andra läkemedel**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

- andra lokalbedövningsmedel.
- läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika).

### **Graviditet och amning**

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Tillfälligt bruk av Xylocain kutan spray under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.

Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

### **Körförmåga och användning av maskiner**

Xylocain spray har inga eller obetydliga effekter på förmågan att köra bil och hantera maskiner.

## **3. HUR DU ANVÄNDER XYLOCAIN**

Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Använd alltid Xylocain kutan spray enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sprayröret är böjt till sin slutgiltiga form och bör inte böjas ytterligare.

### **Om du använt för stor mängd av Xylocain**

Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR**

Liksom alla läkemedel kan Xylocain orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

*Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):* Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med t ex utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

## **5. HUR XYLOCAIN SKA FÖRVARAS**

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

### **Innehållsdeklaration**

1 spraydos innehåller:

- Den aktiva substansen är lidokain 10 mg
- Övriga innehållsämnen är etanol 96% (24,1 mg), makrogol, bananessens, mentol, sackarin och vatten.

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

50 ml spray i pumpflaska

Korta sprayrör

Långa sprayrör, sterila

Förpackningen innehåller ett kort sprayrör. Korta sprayrör kan autoklaveras (20 minuter, 120 °C).

Långa sterila sprayrör är enbart för engångsbruk och måste beställas separat. Dessa får inte autoklaveras igen.

Både korta och sterila, långa sprayrör finns tillgängliga i förpackningar om 50 st vardera.

**Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare**

AstraZeneca AB  
151 85 Södertälje  
tel 08-553 260 00

**Denna bipacksedel godkändes senast**

## **BIPACKSEDEL FÖR ANVÄNDNING TILL DJUR**

Xylocain 10 mg/dos kutan spray, lösning

### **1. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH TILLVERKNING**

AstraZeneca AB  
151 85 Södertälje

### **2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Xylocain 10 mg/dos, kutan spray, lösning  
Lidokain

Lösningen är en klar till nästan klar, svagt rosafärgad vätska med mentol- och banansmak.

### **3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

1 spraydos innehåller:

- Den aktiva substansen är lidokain 10 mg
- Övriga innehållsämnen är etanol 96% (24,1 mg), makrogol, bananessens, mentol, sackarin och vatten.

### **4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Xylocain kutan spray kan användas till djur, t ex vid tandstensskrapning på hund, vid enklare spenoperationer, vid ringning av tjur och vid snitt i mindre bölder.

Xylocain kutan spray innehåller ett lokalbedövningsmedel och har smärtstillande effekt.

### **5. KONTRAINDIKATIONER**

Xylocain ska inte användas vid överkänslighet mot lokalanestetika eller mot något av innehållsämnen i detta läkemedel.

### **6. BIVERKNINGAR**

Inga biverkningar har rapporterats för Xylocain kutan spray.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

## **7. DJURSLAG**

Djurslag som inte används till livsmedelsproduktion.

## **8. DOSERING, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG**

Sprayas på slemhinnorna. Ett pumpslag = 10 mg lidokain.

Till katt: Ett pumpslag för anestesi av stämbanden vid intubering.

Vid en studie på katt sövd enligt klinisk praxis med en engångsdos om 30 mg (motsvarande 3 ggr normal klinisk dos) sågs milda luftvägssymptom både kliniskt och histopatologiskt.

Fyllning av sprayröret: Innan dosering, spraya i luften till ett jämnt flöde åstadkommit.

Sprayröret är böjt till sin slutgiltiga form och bör inte böjas ytterligare.

## **9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING**

-

## **10. KARENSTID**

Ej relevant.

## **11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter Utg.dat.

## **12. SÄRSKILDA VARNINGAR**

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Xylocain kutan spray får endast användas till katt med försiktighet på grund av risken för allvarliga luftvägssymptom.

Xylocain kutan spray ska användas med försiktighet samtidigt med andra lokalbedövningsmedel.

Användning av Xylocain kutan spray i svalget kan påverka sväljförmågan och öka risken för bitskador.

Om munslemhinnan är skadad ökar risken för förgiftning eftersom upptaget av lidokain i kroppen blir större.

Överdosering:

Biverkningar av samma typ som uppträder vid absolut överdosering av parenteralt (t ex med injektion) tillfört lidokain kan inträffa vid överdosering av Xylocain kutan spray. Med rekommenderade doser är dock förgiftningssymtom med allmänpåverkan osannolik.

Överdoseringsymtom är i huvudsak relaterade till centrala nervsystemet och hjärtat.

**13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

**14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

2014-03-14

**15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**